


Návod k použití



Calciumhydroxid-hochdispers (Hydroxid vápenatý-vysoce disperzní)

Jednorázová stříkačka
1,8 g pasta

Obsažené látky:
vysoce disperzní hydroxid vápenatý, metylcelulóza, destilovaná voda.

Indikace / Určení účelu:
Pasta z čistého hydroxidu vápenatého s vysokou disperzitou. K přímému překrytí pulpy. K výrobě mléka z hydroxidu vápenatého k výplachům kořenových kanálků. K ošetření kořenových kanálků s Depotphoresou® a bez ní, také mléčných zubů. Rovněž jako dočasná vložka.

Použití:
K doclení požadovaných vlastností (neutralizace, redukce choroboplodných zárodků) aplikovat vždy ve vlhkém stavu, poté je možno povrchově sušit teplým vzduchem.

Překrytí pulpy: Tenká vrstva pasty se nanese na dno kavity. Následně je možno povrchově vysušit teplým vzduchem. Na to se beztlakově aplikuje podložka.

Ošetření kořenových kanálků s Depotphoresou® a bez ní: Calciumhydroxid-vysoce disperzní se zanesе lentulem do kořenového kanálku. Pro Depotphoresu® se musí pasta Calciumhydroxid-vysoce disperzní pomocí destilované vody (Ph. Eur.; farmac. výr.) rozmíchat do smetanové konzistence.

Výplachy s vysoce disperzním hydroxidem vápenatým: Vápenné mléko se vyrobí protřepáním přibližně 20 % pasty v destilované vodě (Ph. Eur.; farmac. výr.).

Vlastnosti:
Pasta z čistého hydroxidu vápenatého s vysokou disperzitou. Dobrý účinek vysoce disperzního hydroxidu vápenatého je založen na jeho silné zásaditosti (pH =13). Vůči prokrvené tkáni se po počátečním naleptání způsobeným proteolýzou, která zajišťuje redukci choroboplodných zárodků na kontaktních plochách, rychle vytvoří membrána z uhličitanu vápenatého. Tato zamezuje difuzi rozpuštěného hydroxidu vápenatého, takže výsledkem je mírná alkalita, podporující tvorbu nového dentinu a kostí.. Hydroxid vápenatý vykazuje tyto vlastnosti pouze ve vlhkém stavu, proto se u vysoce disperzního hydroxidu vápenatého upustilo od doplňkových vytvzracovacích přísad.

Odkaz:
K aplikační stříkačce je přiloženo 5 kusů Luer-kanyl. Náhradní kanyly lze dodat. Kanyly jsou určeny k jednorázovému použití. Jinak hrozí riziko infekce. Při přípravě kanyl dochází mimo jiné k termickému rozkladu umělé hmoty, při němž mohou vznikat také toxické monomery. Po použití je nutno kanyly řádně likvidovat do odpadů.

Jak zabráním vysychání stříkačky vysoce disperzního hydroxidu vápenatého?
Abychom zabránili vysychání stříkačky, je nutno Luer Lock uzávěr udržovat v čistotě a nepoužívanou stříkačku pečlivě uzavřít. Před každým použitím vytlačit trochu pasty ze stříkačky a teprve potom nasadit kanylu. Po použití nasát pár kapek destilované vody (Ph.Eur.;farmac.výr.). Přebytknou vodu před upotřebením s pastou odstranit.

Pozor! Tento zdravotnický prostředek může být používán i u těhotných, kojících žen a dětí od 6 let, jelikož však nejsou dostatečně dokumentovány zkušenosti s jeho použitím u těhotných a kojících žen a dětí mladších 6 let, měl by se tento zdravotnický prostředek v těchto případech použít až po poradě s ošetřujícím lékařem.

Kontraindikace a interakce: žádná

Upozornění:
Zabraňte kontaktu s očima!
Neinjektovat!
Stříkačku pevně uzavřít!

Použitelnost do: uvedeno na obale.

Produkt lze vydat pouze odbornému stomatologickému personálu.


Prosím, nepoužívejte přípravek po uplynutí expirační doby. Je třeba zajistit odpovídající likvidaci odpadu. Před likvidací do duálního systému musí být balení zcela vyprázdněna. Zbytky produktu přijme výrobce bezplatně zpět.

Pokud máte otázky nebo problémy při použití tohoto zdravotnického prostředku, obraťte se, prosím, přímo na Humanchemie GmbH. Rádi Vám poradíme.

 **HUMANCHEMIE GmbH, Hinter dem Krüge 5, DE-31061 Alfeld (Leine), Niedersachsen, Deutschland**
Tel. +49 (0) 51 81 – 2 46 33
Fax +49 (0) 51 81 – 8 12 26
www.humanchemie.de

2016-07 cs

Návod k použití



Calciumhydroxid-hochdispers (Hydroxid vápenatý-vysoce disperzní)

Jednorázová stříkačka
1,8 g pasta

Obsažené látky:
vysoce disperzní hydroxid vápenatý, metylcelulóza, destilovaná voda.

Indikace / Určení účelu:
Pasta z čistého hydroxidu vápenatého s vysokou disperzitou. K přímému překrytí pulpy. K výrobě mléka z hydroxidu vápenatého k výplachům kořenových kanálků. K ošetření kořenových kanálků s Depotphoresou® a bez ní, také mléčných zubů. Rovněž jako dočasná vložka.

Použití:
K doclení požadovaných vlastností (neutralizace, redukce choroboplodných zárodků) aplikovat vždy ve vlhkém stavu, poté je možno povrchově sušit teplým vzduchem.

Překrytí pulpy: Tenká vrstva pasty se nanese na dno kavity. Následně je možno povrchově vysušit teplým vzduchem. Na to se beztlakově aplikuje podložka.

Ošetření kořenových kanálků s Depotphoresou® a bez ní: Calciumhydroxid-vysoce disperzní se zanesе lentulem do kořenového kanálku. Pro Depotphoresu® se musí pasta Calciumhydroxid-vysoce disperzní pomocí destilované vody (Ph. Eur.; farmac. výr.) rozmíchat do smetanové konzistence.

Výplachy s vysoce disperzním hydroxidem vápenatým: Vápenné mléko se vyrobí protřepáním přibližně 20 % pasty v destilované vodě (Ph. Eur.; farmac. výr.).

Vlastnosti:
Pasta z čistého hydroxidu vápenatého s vysokou disperzitou. Dobrý účinek vysoce disperzního hydroxidu vápenatého je založen na jeho silné zásaditosti (pH =13). Vůči prokrvené tkáni se po počátečním naleptání způsobeným proteolýzou, která zajišťuje redukci choroboplodných zárodků na kontaktních plochách, rychle vytvoří membrána z uhličitanu vápenatého. Tato zamezuje difuzi rozpuštěného hydroxidu vápenatého, takže výsledkem je mírná alkalita, podporující tvorbu nového dentinu a kostí.. Hydroxid vápenatý vykazuje tyto vlastnosti pouze ve vlhkém stavu, proto se u vysoce disperzního hydroxidu vápenatého upustilo od doplňkových vytvzracovacích přísad.

Odkaz:
K aplikační stříkačce je přiloženo 5 kusů Luer-kanyl. Náhradní kanyly lze dodat. Kanyly jsou určeny k jednorázovému použití. Jinak hrozí riziko infekce. Při přípravě kanyl dochází mimo jiné k termickému rozkladu umělé hmoty, při němž mohou vznikat také toxické monomery. Po použití je nutno kanyly řádně likvidovat do odpadů.

Jak zabráním vysychání stříkačky vysoce disperzního hydroxidu vápenatého?
Abychom zabránili vysychání stříkačky, je nutno Luer Lock uzávěr udržovat v čistotě a nepoužívanou stříkačku pečlivě uzavřít. Před každým použitím vytlačit trochu pasty ze stříkačky a teprve potom nasadit kanylu. Po použití nasát pár kapek destilované vody (Ph.Eur.;farmac.výr.). Přebytknou vodu před upotřebením s pastou odstranit.

Pozor! Tento zdravotnický prostředek může být používán i u těhotných, kojících žen a dětí od 6 let, jelikož však nejsou dostatečně dokumentovány zkušenosti s jeho použitím u těhotných a kojících žen a dětí mladších 6 let, měl by se tento zdravotnický prostředek v těchto případech použít až po poradě s ošetřujícím lékařem.

Kontraindikace a interakce: žádná

Upozornění:
Zabraňte kontaktu s očima!
Neinjektovat!
Stříkačku pevně uzavřít!

Použitelnost do: uvedeno na obale.

Produkt lze vydat pouze odbornému stomatologickému personálu.

Prosím, nepoužívejte přípravek po uplynutí expirační doby. Je třeba zajistit odpovídající likvidaci odpadu. Před likvidací do duálního systému musí být balení zcela vyprázdněna. Zbytky produktu přijme výrobce bezplatně zpět.

Pokud máte otázky nebo problémy při použití tohoto zdravotnického prostředku, obraťte se, prosím, přímo na Humanchemie GmbH. Rádi Vám poradíme.

 **HUMANCHEMIE GmbH, Hinter dem Krüge 5, DE-31061 Alfeld (Leine), Niedersachsen, Deutschland**
Tel. +49 (0) 51 81 – 2 46 33
Fax +49 (0) 51 81 – 8 12 26
www.humanchemie.de

2016-07 cs